

پیٹ سکا ڈنگ
اور سپرے سے متعلق
ضروریات ہدایات



ڈائریکٹوریٹ جزل پیسٹ وارنگ اینڈ کنٹرول آف پیسٹس اینڈ زنجاب لاہور

(1) پیسٹ سکاؤنگ۔ (Pest Scouting)

(Definition) تعریف۔

کسی خاص قطعہ فصل (Management Unit Field) میں ایک مقررہ وقت پر نقصان رسان عوامل (کیڑے، بیماری، جڑی بولی وغیرہ) کی تعداد اور ان سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا۔

ضرورت:

نقصان رسان عوامل کے موثر تارک کے لیے مناسب ترین وقت معلوم کرنا۔

(Pest survey) پیسٹ سروے۔

ایک وسیع علاقہ میں نقصان رسان عوامل کی اوسط تعداد اور ان کے نقصان کا اندازہ کرنا۔ سروے کا عمل تمام سال چاری رہتا ہے اس طرح ان علاقوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے جہاں پر آئندہ ہمہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ان عوامل کا دوران حیات معلوم کیا جاتا ہے۔



Hand Sprayer



ULV Sprayer



Power Sprayer

(Importance) پیسٹ سکاؤنگ کے فوائد۔

- 1۔ ضرر رسان عوامل کی پیشین گوئی۔
- 2۔ ضرر رسان عوامل سے متاثرہ حصوں کی نشاندہی۔
- 3۔ کیڑوں کے دوران زندگی میں کمزور اور حساس پہلوؤں کی نشاندہی۔
- 4۔ ضرر رسان کیڑوں کے اندازو کے لیے لامپ۔
- 5۔ کیڑوں کے خلاف پرے کے لیے صحیح زبردست وقت کا انتخاب۔
- 6۔ صرف متاثرہ حصوں کی زبردستی۔
- 7۔ مفید کیڑوں کو بڑھنے پھو لئے کا موقع ملتا۔
- 8۔ اندازہ ہند پرے سے بچاؤ سے پرے کی تعداد اور خرچ اور وقت میں بچت۔

پیسٹ سکاؤنگ کے مقاصد۔

(Pest Trend) کیڑے کا رجحان۔

(Level of Damage) نقصان پہنچانے کی حد۔

فصل کی حالت اور بڑھوٹری کی رفتار (Crop Condition And Development) فصل کے

سارے عرصے کے دوران مددوچہ بالا معلومات کیمپ پہنچانا جن کا پہلا اور آخری مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا اور زرعی ادویات کا بے مقصد اور اندازہ ہند پرے روکنا ہے۔

پیسٹ سکاؤنگ کے لیے ہدایات

1۔ فصل کا ہر بیٹھ باقاعدگی سے معائنہ کیا جائے۔

- 2۔ فصل کی ابتداء سے پیٹ سکاؤ نگ کی جائے۔
- 3۔ پیٹ سکاؤ نگ کے لیے سچ اور شام کا وقت نہیں موزوں ہے۔
- 4۔ پیٹ سکاؤ نگ ایک ایکڑ سے کم یا زیادہ رقبہ پر کی جاسکتی ہے لیکن 25 ایکڑ کے رقبہ کے لیے 15 ایکڑ کو پہنچنے تصور کیا جاتا ہے۔
- 5۔ فصلوں کی ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ پیٹ سکاؤ نگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔

Economic Threshold Level (ETL)

کسی بھی کیڑے کے نقصان کی معافی حد اس کیڑے کی اس سطح نقصان کو ظاہر کرتی ہے جب ان کے خلاف زہر پاشی لازمی ہو جاتی ہے یعنی نقصان کی اس حد تک زہر پاشی کی قیمت کیڑے سے پہنچنے والے نقصان سے کم یا برابر ہو اس وقت زہر پاشی نہ کرنے کی صورت میں جملہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ کسی ایک کیڑے یا زیادہ کیڑوں کی حد تھی نہ ہوگی بلکہ اس کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے مثلاً فصل کا قد۔ اس کی بڑھوتری، کیڑوں کے جملہ کی خاصیت یا شدت حالت اور مقدار پر ہوتا ہے۔

پرے سے بہتر تنگ حاصل کرنے کے بنیادی اصول

- 1۔ صحیح کام کرتا ہوا پرے استعمال کریں۔ پرے یہ ایک سے زیادہ رکھیں یا کہ ایک خراب ہونے پر دوسرا استعمال کیا جاسکے۔
- 2۔ سب سے پہلے ٹینکی کو صاف پانی سے آدھا بھر کر اس میں زہر کی مطلوبہ مقدار ڈالیں، پھر اس کو پورا بھر دیں اور پرے کریں۔ میں میں متوجہ پہلے زہر ڈالیں اور نہ سب سے آخر میں۔ اس طرح محلول صحیح تیار نہیں ہوگا۔
- 3۔ ہوا کی مخالف سمت میں پرے نہ کریں۔
- 4۔ پرے ٹھنڈے وقت یعنی سچ 9 بجے تک اور شام 4 بجے کے بعد کریں۔
- 5۔ پرے کرتے وقت پودوں سے یوم کی اونچائی ڈیڑھ فٹ رکھیں تاکہ زہر کی پھوار پودوں کے ہر حصے پر پہنچ سکے۔
- 6۔ محلول پودوں پر زیادہ گرنے سے فصل کا نقصان ہو سکتا ہے اور کم گرنے سے کیڑے مکوڑوں کا موثر کمزور نہیں ہوتا۔
- 7۔ نوزل چیک کریں کہ ان کے سوراخ بند یا زیادہ کھلے تو نہیں خراب نوزل فوراً تبدیل کر لیں۔
- 8۔ کیڑے مار زہر ہیں پرے کرنے کے لیے بالکوں نوزل استعمال کریں۔

پرے کرتے وقت احتیاطی تدابیر

- 1۔ خالی بیٹ پرے نہ کیا جائے کیونکہ زہر کا اثر اس حالت میں جلدی ہوتا ہے۔
- 2۔ رُخی آدمی سے ہرگز پرے نہ کروائیں۔
- 3۔ ایک کارکن مسلسل ایک گھنٹے سے زیادہ پرے کا کام نہ کرے۔

4. پرے کرتے وقت بیک، ماسک، دستانے، اور گوت اور پاؤں میں ریز کے بوٹ پہنیں۔
5. پرے کے دران سانس کے ذریعہ زہر کو جسم میں داخل نہ ہونے دیں۔
6. اگر زہر جلد پر گرفتار ہو تو فوراً دھولیں۔
7. آنکھوں میں زہر چڑھنے کی صورت میں 15 منٹ تک پانی سے آنکھیں دھوئیں۔
8. زہر کا اثر ہو جانے کی صورت میں فوراً اکڑ سے رجوع کریں۔
9. پرے میں بھی بھی زہر کو لاتا ہے، نہر، کوئی بیانی کے کھال میں ہرگز دگر اکٹھیت میں چھوٹا سا گزر ہائیکل کر میں میں انٹریل دیں اور دوپٹی ڈال دیں۔
10. پرے میں بھی بھی زہر کو لاتا ہے، نہر، کوئی بیانی کے کھال میں ہرگز دگر اکٹھیت میں چھوٹا سا گزر ہائیکل کر میں میں انٹریل دیں اور دوپٹی ڈال دیں۔
11. زہر پاشی کے بعد حساسیوں کو کوت اور میٹیوں کو جو کو صاف کروئیں۔
12. زہر پاشی کے بعد مرغیوں اور جانوروں کوں دن تک فعل کے بندیک رہ آنے دیں۔
13. پرے کے ہوئے کھیت میں فوری طور پر داخل شہوں اور شپوں اور مویشیوں کو اس میں داخل ہونے دیں۔ پرے کے ہوئے کھیت سے کم از کم 15 دن تک چارہ نکلا گیں اور نہ بڑی وغیرہ تو رکر پازار لے جائیں۔



تیار کردہ

ڈاکٹر یکٹوریٹ جزل پیسٹ وارنگ اینڈ کواٹی کنٹرول
آف پیٹشی سائنسز پنجاب، لاہور