

صحرائی ٹڈی دل کا انسداد

انفرادی حالت

عموماً صحرائی ٹڈی دل انفرادی حالت میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اس صورت میں ٹڈی پودوں اور فصلوں کو بہت کم نقصان پہنچاتی ہے اور نہ ہی اسکی آبادی زیادہ بڑھتی ہے۔ اس حالت میں صحرائی ٹڈی دل ٹیچرہ ٹیچرہ زندگی گزارتی ہے اور چھلانگیں لگا کر چلتی ہے اور پونگ کارنگ ہلکا ہنزا اور بالغ ہلکا ہنزا بھورا ہوتا ہے۔

جھنڈ کی حالت

جب موسم اسکی افزائش کیلئے سازگار ہو تو اسکی آبادی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس سے صحرائی علاقوں میں اس کیلئے خوراک کم پڑ جاتی ہے اور اسکی جسم میں سرینوئین کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ جھنڈ یا ٹھکر کی شکل اختیار کر کے اجتماعی حالت میں آ جاتی ہے۔ اس حالت میں صحرائی ٹڈی دل کے اندر تیز رفتاری اور لمبے قاصلے تک اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحرائی ٹڈی دل کا ایک جھنڈ کروڑوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ تھنڈ کی حالت میں ٹڈی دن کے وقت متحرک ہوتی ہے اور اپنے راستے میں آنے والے ہر طرح کے سبزہ کا سفایا کر دیتی ہے۔ اس حالت میں پونگ گہرا ہنزا اور بالغ پیلے گلابی مائل بھورا پھر پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے۔

انفرائش نسل

ہمارے ہاں عام طور پر سال میں دو موسموں میں صحرائی ٹڈی دل کی انفرائش نسل ہوتی ہے اور ایک سال میں صحرائی ٹڈی دل کی چھ نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ اسکی انفرائش درج ذیل موسموں میں ہوتی ہے۔
موسم بہار کی انفرائش: (فروری سے مئی) موسم گرما میں انفرائش: (جون سے ستمبر)

صحرائی ٹڈی دل کا تدارک

صحرائی ٹڈی دل کے تدارک کیلئے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں تاہم صحرائی ٹڈی دل جب پونگ کی حالت میں ہوتی آسانی سے کنٹرول کی جاسکتی ہے جبکہ بالغ پروان کو کنٹرول کرنا قدرے مشکل ہے۔ صحرائی ٹڈی دل کے انسداد کیلئے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔

طبیعی طریقہ انسداد

- صحرائی ٹڈی دل کے انڈے دینے والی جگہوں کی نشاندہی کے بعد انڈوں کی تھیلیوں کو کھرپے کی مدد سے زمین کھود کر یا مٹی چلا کر پرندوں اور کیڑوں کے کھانے کے لئے چھوڑ دیں۔
- زمین میں مگزی کے انڈوں کی نشان دہی ہوتے ہی جہاں سورخ نظر آئیں ان کے ارد گرد دو تا تین فٹ گہری اور چوڑی کھائی کھود کر ان میں جمع ہونے والے بچوں کو مٹی میں دفن کر دیں یا ٹھکر زراعت کی طرف سے سفارش کردہ زہر کا دھوڑا کریں۔


ٹڈی کی کئی اقسام ہیں لیکن سب سے اہم قسم کو صحرائی ٹڈی دل (مگزی) کہا جاتا ہے۔ صحرائی ٹڈی دل ہمیشہ لشکر کی صورت میں حملہ کرتی ہے۔ یہ ٹڈی اپنے راستے میں آنے والے ہر طرح اور ہر حالت کے پودوں، فصلوں اور درختوں کو بری طرح نقصان پہنچاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے جھنڈ ہونے کی وجہ سے اسکا انسداد بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحرائی ٹڈی دل عام طور پر شمال مشرقی افریقہ سے شروع ہوتی ہے اور یمن، عمان، سعودی عرب اور ایران سے ہوتی ہوئی پاکستان اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس سال جنوبی ایشیا میں مغربی ہوا کی معمول سے زیادہ پھیلنے اور معمول سے زیادہ بارشوں کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب سے صحرائی ٹڈی دل پاکستان کے صوبہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں آئی۔ روایتی طور پر یہ ٹڈی چولستان اور قحط میں پائی جاتی تھی لیکن اس سال اس کا حملہ بلوچستان اور بھارت سے تھنڈ داخل ہونے کی وجہ سے ہماری فصلات کے علاقوں جن میں راجن پور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیہ، بمبکر، خوشاب، جھنگ، رحیم یار خان، بہاولپور، بہاولنگر، ساہیوال، پاکپتن اور اٹک کے علاقوں میں مشاہدہ میں آیا ہے۔

دوران حیات

انڈے سے لیکر بالغ تک 60 تا 180 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنا دوران حیات تیزی سے مکمل کرتا ہے جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے بڑھوتری بہت کم ہوتی ہے اور یہ 180 دن تک اپنا دوران حیات مکمل کرتی ہے۔ انڈوں سے بچے 10 سے 65 دن تک نکل آتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کے مختلف مراحل پورے کر کے 5 مختلف حالتوں سے گزر کر 24 سے 95 دن میں بالغ ٹڈی بن جاتی ہے۔ بالغ ٹڈی 10 سے 15 دن کے بعد ہم جنمیتی کرتے ہیں اور پھر مادہ زرم رستی یا بنجر میرا زمین ڈھونڈ کر انڈے دینا شروع کر دیتی ہے۔ مادہ زمین میں 3 سے 14 گھنٹے میں انڈے دیتی ہے اور ان انڈوں کے گرد ایک تھیلی بنا دیتی ہے۔ ایک تھیلی میں 80 تا 100 انڈے ہوتے ہیں اور ایک مادہ اپنی زندگی میں 10 سے 12 ایسی تھیلیاں بناتی ہے۔


صحرائی ٹڈی دل کی حالتیں

صحرائی ٹڈی دل دو طرح سے اپنی زندگی گزارتی ہے جو درج ذیل ہیں:



جھنڈ کی حالت کی پہچان

انفرادی حالت کی پہچان




Locust

صحرائی ٹڈی دل کا انسداد



محکمہ زراعت حکومت پنجاب



صحرائی ٹڈی دل کا دوران حیات

- صحرائی ٹڈی دل کے لٹکرے کو فصل پہنچنے سے پہلے دھواں کر کے یا دھواں بجا کر یا پٹا مار کر فصلوں پر پھینکنے سے بچائیں۔
- پیٹھے ہوئے جھنڈ پر آگ کے شعلے پھینکنے والی مشین (Flame Thrower) سے شعلے برسائیں۔
- زمین پر چھٹی ہوئی صحرائی ٹڈی دل کے جھنڈ کو مارنے کیلئے سہاگہ چلائیں یا بھینڈ بکریوں کے ریوڑ چھوڑیں۔

حیاتیاتی طریقہ انسداد

- تیسری اور چوتھی صحرائی ٹڈی دل کا جھنڈ کر کے انکی تعداد میں کمی کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔
- زینتی اور ریٹسوس بھونڈی کے بالغ قاعدہ مند کیڑے ہیں اور یہ صحرائی ٹڈی دل کو کھاتے ہیں۔

کیمیائی طریقہ انسداد

- ہوائی جہاز کی مدد سے اڑتے ہوئے لٹکرے اوپر بلندی سے ULV سپرے کریں۔
- کاربنل 85، ڈیو پی کو چھڑک کر یا گندم کے جھوسے میں 1:25 کے تناسب سے ماکرز زہر یا اطعمہ (Bait) تیار کر کے لٹکرے میں بکھیریں۔
- صحرائی ٹڈی دل کے بویائی انسداد کے لئے درج ذیل زہروں میں سے کسی ایک زہر کا جب تک باہر سے نشین اور درختوں پر کیڑے نہ نصب شدہ نشین سے پرے کریں

مشعل کی مقدار	تعداد	مقدار
• 40 لیٹر سی سی	20 لیٹر ٹی ٹی	• 2.5 لیٹر سی سی
• 25 لیٹر سی سی	3 لیٹر ٹی ٹی	• 57 لیٹر سی سی
• 185 لیٹر سی سی	1 ٹن ڈی ڈی	25 ٹن ڈی ڈی

تیار کردہ: ایوب زری، تحقیقی ادارہ فیصل آباد | زری یونیورسٹی فیصل آباد | ایم این ایس، زری یونیورسٹی ملتان

www.agripunjab.gov.pk
اشاعت: فروری 2020
تعداد: 2000

نظامت زرعی اطلاعات پنجاب